

## Stappenplan voor ambulanceverpleegkundigen

### Stap 1

Vermoeden beroerte +  
FAST score 2 of 3



Scheve mond?



Verwarde spraak?



Lamme arm?

### Stap 2

Check in- en exclusiecriteria

#### Inclusiecriteria:

- patiënt  $\geq 18$  jaar
- mogelijkheid aanbrengen pleister < 3 uur na aanvang klachten
- systolische bloeddruk  $\geq 140$  mmHg
- intentie presentatie deelnemend ziekenhuis

#### Exclusiecriteria:

- Comateus (EMV score < 8)
- Verblijf in verpleeghuis of revalidatiecentrum
- **Bekende** zwangerschap/borstvoeding
- Indicatie acute behandeling met nitroglycerine of gebruik nitroglycerine in afgelopen 12 uur
- **Bekende** overgevoeligheid voor nitroglycerine, nitraten, of kleefstoffen in pleister
- **Bekende** myocard insufficiëntie t.g.v. obstructie, aorta- of mitralisklepstenose, constrictieve pericarditis, hypertrofische obstructieve cardiomyopathie, harttamponnade
- **Bekende** anemie (Hb < 5 mmol/L)
- **Bekend** kamerhoek glaucoom
- **Bekend** gebruik fosfodiësteraseremmers (viagra)

### Stap 3

Controleer  
temperatuurlgger  
in doosje met nitroglycerine  
pleisters



Vinkje ✓ in scherm: ga door met inclusie.

Kruisje ✗ in scherm: neem contact op met de MR ASAP telefoon (06 - 51 87 19 01).


Indien ieder inclusiecriteria en géén exclusiecriteria van toepassing:  
**geschikte kandidaat!**

Stap 4 Z.O.Z.

## Stap 4

### Gebruik app om te loten: wél of géén pleister

1. Open de MR ASAP app
2. Vul gegevens in.
3. Druk op randomiseren.
4. In het scherm verschijnt het randomisatie resultaat.



## Stap 5a

### Indien geloot voor wél pleister:

1. Registreer charge nummer in randomisatie app.
2. Plak pleister zichtbaar op onbehandelde huid, zoals nek/schouder /bovenarm.



## Stap 5b

### Indien geloot voor geen pleister:

Plak géén pleister!

## Stap 6

### Rij naar deelnemend ziekenhuis\*

Draag over dat patiënt geïncludeerd is in MR ASAP en vermeld randomisatie uitslag (wel of geen pleister) + randomisatiecode.



\*Bij onderweg herkennen exclusiecriteria óf als je toch naar niet-deelnemend centrum rijdt óf bij ernstige complicatie nitroglycerine: **verwijder pleister.**

## Informed consent

1. In de ambulance hoeft niet om informed consent te worden gevraagd, dit wordt in het ziekenhuis achteraf gedaan.
2. Indien mogelijk kort inlichten van patiënt of vertegenwoordiger.
3. Bij weigering niet includeren.

## Contact MR ASAP team

[www.mrasap.nl](http://www.mrasap.nl)

[mrasap@amc.uva.nl](mailto:mrasap@amc.uva.nl)

06 - 51 87 19 01 (24/7)